

平成30年ブドウ防除暦（巨峰露地栽培）

(株) 山東農園 [フリーダイヤル] 0120-09-9393 [FAX] 073-478-2655

防除時期	対象病害虫	使用薬剤	倍数	収穫前/回数	備考	
3月下旬 (催芽期)	黒とう病・晩腐病 かがらみシ類・ハダニ類	アビオンE ベンレート水和剤 石灰硫黄合剤	500倍 200倍 7倍	-/- 休眠期/1回 発芽前/-	○枝の先端まで十分に散布する。 ○かた多発園ではガットキラー乳剤100倍 ○ベンレート液を作ってから石灰硫黄を加用	
4月上旬(発芽前)	黒とう病・晩腐病	デランFL	200倍	休眠期/1回	○晩腐病の多発園ではアビオンE500倍を加用	
5月上旬 (発芽直後～ 新梢伸長期)	黒とう病・晩腐病・べと病 カイガラムシ類幼虫 フタテヒメヨコバイ・チャノキアザミウマ	ストロビーDF アプロードFL オルトラン水和剤	2000倍 1000倍 1500倍	14日前/3回 30日前/2回 60日前/1回	○うどんこ病多発園ではトリフミン水和剤 =2000倍（7日前/3回）散布。 ○ハマキムシ類・スカシバ類、多発園では フェニックスFL=4000倍（14日前/2回）散布。 ○リドミルゴールドMZの収穫前日数に注意する。 ※ブドウスカシバにも注意!	
5月中～下旬 (開花期)	黒とう病・晩腐病 べと病 フタテヒメヨコバイ	ジマンダイセン水和剤 モスピラン顆粒水溶剤	1000倍 4000倍	45日前/2回 14日前/3回		
6月上旬 (落弁期)	黒とう病・晩腐病・灰カビ病 べと病 チャノキアザミウマ	ファンタジスタ顆粒水和剤 リドミルゴールドMZ ディアナWDG	3000倍 1000倍 10,000倍	14日前/2回 45日前/2回 前日/2回		
6月中旬 (果実小豆大)	晩腐病・べと病 チャノキアザミウマ コガネムシ類	ホライズンDF アグロスリン水和剤	2500倍 2000倍	21日前/3回 7日前/5回		
6月下旬 (袋掛け前)	べと病 チャノキアザミウマ フタテヒメヨコバイ	ジャストフィットFL ダントツ水溶剤	5000倍 3000倍	30日前/3回 前日/3回		
7月上旬 (袋掛け後)	べと病・晩腐病・さび病 チャノキアザミウマ・かがらみシ類	ICホルド-66D アビオンE アグロスリン水和剤	25～100倍 1500倍 2000倍	-/- -/- 7日前/5回		
7月下旬(収穫前)	べと病・さび病	ムッシュボルドーDF アビオンE	500倍 1500倍	-/-		○ハダニ類多発園ではダニコングFL =2000倍（前日/1回）散布。
8月下旬～9月中旬 (収穫後)	べと病・晩腐病・さび病 ブドウトラカミキリ フタテヒメヨコバイ クワコナカイガラムシ	ICホルド-66D アビオンE スミチオン水和剤	25～100倍 1500倍 1000倍	-/- -/- 30日前/2回		○カメムシ：ダントツ水溶剤4000倍が安価で良い。
10月上中旬 (収穫後)	ブドウトラカミキリ	ダントツ水溶剤	4000倍	収穫前日/3回		○害虫の食入孔（木くず、虫糞）があれば ロビンフッドで防除するのが良い。

※太文字および下線部分が昨年の防除暦からの変更点になります。