

平成31年度 うめ（南高）防除暦

(株) 山東農園 ㈱-ﾀｲﾁ 0120-09-9393 FAX 073-478-2655

防除時期	対象病害虫	防除薬剤	倍数	収穫前日数/使用回数	備考
1 2月 (休眠期)	各種病害虫	石灰硫黄合剤	7倍		
開花前	ハナムシ・アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	前日/3回	○多発園のみ
満開後	灰色かび病	ロブラール水和剤	1500倍	45日前/2回	
3月上中旬 (発芽直前～ がく落ち)	かいよう病 アブラムシ類	ムッシュボルドーDF 又はICボルドー66D モスピラン顆粒水溶剤	500倍 50倍 4000倍	葉芽発芽前/- 前日/3回	
3月下旬 (発芽期)	黒星病・すす斑病	デラン F	2000倍	45日前/1回	○かいよう病にはアグレプト水和剤1000倍 (90日前/2回) も可 ただし、使用前日数と回数に注意 ○ロディー水散布は養蜂巣箱撤去後に
	かいよう病	マイコシールド	1500倍	21日前/4回	
	ハナムシ・アブラムシ類	ロディー水和剤	4000倍	7日前/3回	
4月上旬 (幼果期)	灰星病・黒星病 かいよう病	オルフィンプラスF スターナ水和剤	3000倍 1000倍	前日/3回 7日前/3回	○ウメシロカイガラムシ・アブラムシ・ハダニ類には モメントフロアブル2000倍 (7日/3回) 4月中に散布 ※混用順 モメント F → アグレプト水 または マイコシールド ○すす斑症にはオーソサイド水和剤800倍 (21日前/3回) も可 ただし、高温 (25℃以上) や多湿時の薬害に注意 ○黒点症・油揚げ症対策および降雨が多いと予測される場合は グッドパートナー25 の加用が良い ○ベンレート水和剤を収穫直前に使う場合は展着剤を加用する
4月中旬 (果実肥大期)	黒星病・すす斑病 かいよう病	オーソサイド水和剤 マイコシールド	800倍 1500倍	21日前/3回 21日前/4回	
	ケムシ類・コスカシバ	フェニックス F	4000倍	前日/2回	
4月下旬 (果実肥大期)	黒星病・すす斑病	オーソサイド水和剤	800倍	21日前/3回	
	かいよう病	マイコシールド	1500倍	21日前/4回	
5月上旬 (果実肥大期)	黒星病・すす斑病	ベンレート水和剤	3000倍	7日前/1回	
	カイガラムシ類	アプロード F	1000倍	7日前/2回	
5月中下旬 (青梅収穫直前)	黒星病・すす斑病	スコア顆粒水和剤	2000倍	前日/3回	
	カメムシ類・クキイ	ダントツ水溶剤	4000倍	前日/3回	
6月上旬 (漬け梅収穫直前)	黒星病・すす斑病	スコア顆粒水和剤	2000倍	前日/3回	○ケシキスイ対策として バリアド 顆粒水和剤 4000倍 前日/2回 又は フォーエ粒剤 10kg/10a 3日前/1回 水浸漬を30分実施する
7～8月 (収穫後)	ケムシ類	ロディー水和剤	2000倍	7日前/3回	○多発園のみ
9月上中旬 (収穫後)	ウメシロカイガラムシ	アプロード水和剤	1000倍	収穫後落葉前/2回	○多発園のみ ○コスカシバ、キクイムシ (休眠期) には ガットキラール剤100倍 落葉に注意

※太文字および下線部分が昨年の防除暦からの変更点になります。