

# 平成31年度かき防除暦

(株) 山東農園 ㈱-ﾀｲﾁ 0120-09-9393 FAX 073-478-2655

| 防除時期             | 対象病害虫                                 | 防除薬剤                              | 倍数                            | 収穫前日数/使用回数                  | 備考  |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 2月～3月          | 各種病害虫                                 | 粗皮削り及び落葉処理                        |                               |                             | ○落葉病防止には落葉処理が重要   |
| 3月下旬<br>(発芽前)    | カイガラムシ類                               | 石灰硫黄合剤                            | 7倍                            | -/-                         |   |
| 4月下旬<br>(新梢伸長期)  | うどんこ病<br>ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類<br>ﾌｼﾞｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ     | イオウF<br>トクチオン水和剤                  | 500倍<br>800倍                  | -/-<br>75日前/2回              | ○イラガ類、多発園ではコスカシバも含めて<br>フェニックスF 4000倍 が良い。  |
| 5月中下旬<br>(開花期)   | 落葉病・炭そ病<br>ﾌｼﾞｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ<br>ﾊﾀﾑｼ類      | ジマンダイセン水和剤<br>オルトラン水和剤<br>ダニコングFL | <b>400倍</b><br>1500倍<br>4000倍 | 45日前/2回<br>45日前/2回<br>前日/1回 | ○灰色かび病には、フルーツセイバーFLが良い  |
| 6月上旬<br>(幼果期)    | 落葉病・炭そ病・うどんこ病<br>ﾌｼﾞｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ・ﾊﾀﾑｼ    | オンリーワンF                           | 2000倍                         | 前日/3回                       | ○フジコナカイガラムシ多発園では、<br>オルトラン水和剤にかえて<br>トクチオン水和剤800倍（収穫前75日/2回）<br>が良い。ただし、収穫前日数厳守！<br>○ヘタムシ第1世代の防除適期は6/10頃<br>○黒変果の軽減にストピットⅡ 500倍を2～3回<br>散布する。 |
|                  |                                       | オルトラン水和剤<br><b>グッドパートナー-25</b>    | 1500倍<br>1500倍                | 45日前/2回                     |   |
| 6月中下旬<br>(生理落果期) | 落葉病・炭そ病<br>ﾌｼﾞｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ               | ジマンダイセン水和剤                        | <b>400倍</b>                   | 45日前/2回                     |   |
|                  |                                       | コルト顆粒水和剤<br><b>グッドパートナー-25</b>    | 2000倍<br>1500倍                | 前日/3回                       |   |
| 7月上中旬<br>(生理落果期) | 落葉病・炭そ病<br>うどんこ病<br>ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類<br>ｱｶｷﾞ類 | ストロビーDF                           | 3000倍                         | 14日前/3回                     |   |
|                  |                                       | モスピラン顆粒水溶剤                        | 2000倍                         | 前日/3回                       |   |
| 8月上旬<br>(果実肥大期)  | 落葉病・炭そ病<br>うどんこ病<br>ｱｶｷﾞ類<br>ｶｲﾊﾀﾑｼ類  | オンリーワンF                           | 2000倍                         | 前日/3回                       |   |
|                  |                                       | ダントツ水溶剤                           | 3000倍                         | 7日前/3回                      |   |
| 8月下旬             | 落葉病・炭そ病<br>うどんこ病<br>カメムシ類<br>アザミウマ類   | ベンレート水和剤                          | 2000倍                         | 前日/6回                       |   |
|                  |                                       | キラップF                             | 2000倍                         | 7日前/2回                      |   |
| 9月上中旬            | 落葉病・炭そ病<br>うどんこ病<br>ｶﾒﾑｼ類・ｶｲﾊﾀﾑｼ      | スコア顆粒水和剤                          | 3000倍                         | 前日/3回                       |   |
|                  |                                       | アグロスリン水和剤                         | 1500倍                         | 前日/3回                       |   |

※太文字および下線部分が昨年の防除暦からの変更点になります。