

2022年度かき防除暦

(株) 山東農園 [フリーダイヤル] 0120-09-9393 [FAX] 073-478-2655

| 防除時期 | 対象病害虫 | 防除薬剤 | 倍数 | 収穫前日数/使用回数 | 備考 |
|------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|--|
| 12月～3月 | 各種病害虫 | 粗皮削り及び落葉処理 | | | ○落葉病防止には落葉処理が重要 |
| 3月下旬 (発芽前) | カイガラムシ類 | 石灰硫黄合剤 | 7倍 | -/- | |
| 4月下旬 (新梢伸長期) | うどんこ病 アザミウマ類 カイガラムシ | イオウF トクチオン水和剤 | 500倍 800倍 | -/- 75日前/2回 | ○イラガ類、多発園ではコスカシバも含めてフェニックスF 4000倍が良い。 |
| 5月中下旬 (開花期) | 落葉病・炭そ病 チャノキイロアザミウマ ハダニ類 | ジマンダイセン水和剤 オルトラン水和剤 ダニコングFL | 400倍 1500倍 4000倍 | 45日前/2回 45日前/2回 前日/1回 | ○灰色かび病多発園は、ジマンダイセン水和剤にかえてフルーツセイバーF 1500倍が良い。 |
| 6月上旬 (幼果期) | 落葉病・炭そ病・うどんこ病 アザミウマ類・ヘタムシガ | スコア顆粒水和剤 ディアナWDG グッドパートナー25 | 3000倍 10000倍 1000~1500倍 | 前日/3回 前日/2回 | ○フジコナカイガラムシ多発園では、ディアナWDGにかえてトクチオン水和剤800倍（収穫前75日/2回）が良い。ただし、収穫前日数厳守・ドリフト注意！ |
| 6月中下旬 (生理落果期) | 落葉病・炭そ病 アザミウマ類・ヘタムシガ | ジマンダイセン水和剤 コルト顆粒水和剤 グッドパートナー25 | 400倍 2000倍 1000~1500倍 | 45日前/2回 前日/3回 | ○ヘタムシ第1世代の防除適期は6/10頃 |
| 7月上中旬 (生理落果期) | 落葉病・炭そ病・うどんこ病 カイガラムシ類 アザミウマ類 | ナティーボFL モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍 2000倍 | 前日/3回 前日/3回 | ○黒変果の軽減にストピットII 500倍を2~3回散布する。 |
| 8月上旬 (果実肥大期) | 落葉病・炭そ病・すす点病 うどんこ病 アザミウマ類 カメムシ類・ヘタムシガ | ベルコート水和剤 ダントツ水溶剤 | 1500倍 3000倍 | 14日前/3回 7日前/3回 | ○ヘタムシ多発園では、サムコルフ 5000倍（収穫前日/3回）を散布する。 |
| 8月下旬 | 落葉病・炭そ病 うどんこ病 カメムシ類 アザミウマ類 | ベンレート水和剤 キラップF | 2000倍 2000倍 | 前日/6回 7日前/2回 | ○カメムシ発生園では、ダントツ水溶剤4000倍が安価で良い。 |
| 9月上中旬 | 落葉病・炭そ病・灰色かび病 カメムシ類・ヘタムシガ | ナティーボFL アグロスリン水和剤 | 2000倍 1500倍 | 前日/3回 前日/3回 | ○降雨が続いたり炭そ病が心配な園では、9月中旬以降スコア顆粒水3000倍の追加防除が良い。 |

※太文字および下線部分が昨年の防除暦からの変更点になります。