

# 2023年度かき防除暦

(株) 山東農園 [フリーダイヤル] 0120-09-9393 [FAX] 073-478-2655

防除時期	対象病害虫	防除薬剤	倍数	収穫前日数/使用回数	備考
12月～3月	各種病害虫	粗皮削り及び落葉処理			○落葉病防止には落葉処理が重要
3月下旬 (発芽前)	カイガラムシ類	石灰硫黄合剤	7倍	-/-	
4月下旬 (新梢伸長期)	うどんこ病 カカラムシ類 アザミウマ類	イオウF トクチオン水和剤	500倍 800倍	-/- 75日前/2回	○イラガ類、多発園ではコスカシバも含めてフェニックスF 4000倍が良い。
5月中下旬 (開花期)	落葉病・炭そ病 チャノキイロアザミウマ ハダニ類	ジマンダイセン水和剤 オルトラン水和剤 ダニコングFL	400倍 1500倍 4000倍	45日前/2回 45日前/2回 前日/1回	○灰色かび病多発園は、ジマンダイセン水和剤にかえてフルーツセイバーF 1500倍が良い。
6月上旬 (幼果期)	落葉病・炭そ病・うどんこ病 アザミウマ類・ヘタムシガ	スコア顆粒水和剤 ディアナWDG グッドパートナー25	3000倍 10000倍 1000~1500倍	前日/3回 前日/2回	○フジコナカイガラムシ多発園では、ディアナWDGにかえてトクチオン水和剤800倍(収穫前75日/2回)が良い。ただし、収穫前日数厳守・ドリフト注意!
6月中下旬 (生理落果期)	落葉病・炭そ病 カカラムシ類 アザミウマ類	ジマンダイセン水和剤 コルト顆粒水和剤 グッドパートナー25	400倍 2000倍 1000~1500倍	45日前/2回 前日/3回	○ヘタムシ第1世代の防除適期は6/10頃
7月上中旬 (生理落果期)	落葉病・炭そ病・うどんこ病 カカラムシ類 アザミウマ類	ナティーボFL モスピラン顆粒水溶剤	2000倍 2000倍	前日/3回 前日/3回	○黒変果の軽減にストピットII 500倍を2~3回散布する。
8月上旬 (果実肥大期)	落葉病・炭そ病・すす点病 うどんこ病 アザミウマ類 カメムシ類・ヘタムシガ	ベルコート水和剤 ダントツ水溶剤	1500倍 3000倍	14日前/3回 7日前/3回	○ヘタムシ多発園では、サムコルフ 5000倍(収穫前日/3回)を散布する。
8月下旬	落葉病・炭そ病 うどんこ病 カメムシ類 アザミウマ類	ベンレート水和剤 キラップF	2000倍 2000倍	前日/6回 7日前/2回	○カメムシ発生園では、ダントツ水溶剤4000倍が安価で良い。
9月上中旬	落葉病・炭そ病・灰色かび病 カメムシ類・ヘタムシガ	ナティーボFL アグロスリン水和剤	2000倍 1500倍	前日/3回 前日/3回	○降雨が続いたり炭そ病が心配な園では、9月中旬以降スコア顆粒水3000倍の追加防除が良い。

※太文字および下線部分が昨年の防除暦からの変更点になります。