

2024年ブドウ防除暦（巨峰露地）

（株）山東農園 [フリーダイヤル] 0120-09-9393 [FAX] 073-478-2655

防除時期	対象病害虫	使用薬剤	倍数	収穫前/回数	備考
3月下旬 (催芽期)	黒とう病・晩腐病	ベンレート水和剤	200倍	休眠期/1回	○枝の先端まで十分に散布する。 ○たけり多発園ではガットキラー乳剤100倍 ○ベント液を作ってから石灰硫黄合剤を加用
	かがらみ類・ハダニ類	石灰硫黄合剤 グッドパートナー25	7倍 500倍	発芽前/-	
4月上旬(発芽前)	黒とう病・晩腐病	デランフロアブル	200倍	休眠期/1回	○晩腐病の多発園ではグッドパートナー500倍を加用
5月上旬(発芽直後 ~新梢伸長期)	黒とう病・晩腐病・べと病 チャノキアザミヤ・ケムシ類	ストロビーDF	2000倍	14日前/3回	
		エクシレルSE	5000倍	前日/3回	
5月中~下旬 (開花期)	黒とう病・晩腐病 べと病 フタテンヒメヨコバイ・チャノキアザミヤ	ジマンダイセン水和剤	1000倍	45日前/2回	○うどんこ病多発園ではトリフミン水和剤 =2000倍(7日前/3回)散布。 ○ハマキムシ類・スカシバ類、多発園では フェニックスFL=4000倍(14日前/2回)散布。 ○リドミルゴールドMZの収穫前日数に注意する。
		コテツFL	4000倍	60日前/2回	
6月上旬 (落弁期)	黒とう病・晩腐病・灰カビ病 べと病 チャノキアザミヤ・かがらみ類	ファンダス顆粒水和剤	3000倍	14日前/3回	
		リドミルゴールドMZ コルト顆粒水和剤	1000倍 3000倍	45日前/2回 前日/3回	
6月中旬 (果実小豆大)	黒とう病・晩腐病・べと病 チャノキアザミヤ	ホライズンDF ディアナWDG	2500倍 10000倍	21日前/3回 前日/2回	○カイガラムシ多発園ではトランスフォームFが良い。
6月下旬 (袋掛け前)	べと病 チャノキアザミヤ・かがらみ類 フタテンヒメヨコバイ	レーバスフロアブル	2000倍	7日前/3回	○黒とう病・晩腐病の発生園ではオンリーワンFL 2000倍(前日/3回)を加用する。
		アグロスリン水和剤	2000倍	21日前/5回	
7月上旬 (袋掛け後)	べと病・晩腐病・さび病 チャノキアザミヤ・かがらみ類	ICボルト-66D	25倍	-/-	
		ダントツ水溶剤 グッドパートナー25	2000倍 1000~1500倍	前日/3回	
7月下旬(収穫前)	べと病・さび病	ムッシュボルドーDF	500倍	-/-	○ハダニ類多発園ではダニコングFL =2000倍(前日/1回)散布。
		グッドパートナー25	1000倍		
8月中旬 (収穫中)	べと病 カメムシ類・コガネムシ類	ICボルト-66D ダントツ水溶剤	25倍 2000倍	-/- 前日/3回	
8月下旬~9月中旬 (収穫後)	べと病・晩腐病・さび病 トラカミキリ・ヨコバイ クワコナカイガラムシ	ICボルト-66D	25倍	-/-	○カメムシ：ダントツ水溶剤4000倍が安価で良い。
		スミチオン水和剤 グッドパートナー25	1000倍 1000倍	21日前/2回	
10月上中旬 (収穫後)	ブドウトラカミキリ	ダントツ水溶剤	4000倍	収穫前日/3回	○害虫の食入孔(木くず、虫糞)があれば ロビンフッドで防除するのが良い。

※太文字および下線部分が昨年の防除暦からの変更点になります。