

2024年度 うめ（南高）防除暦

(株) 山東農園

[フリーダイヤル] 0120-09-9393

[FAX] 073-478-2655

-13-

防除時期	対象病害虫	防除薬剤	倍数	使用時期/使用回数	備考
1 2月（休眠期）	各種病害虫	石灰硫黄合剤	7倍		
開花前	ハナムシ・アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	前日/3回	○多発園のみ
満開後	灰色かび病	ロブラール水和剤	1500倍	45日前/2回	
3月上中旬 (がく落ちまで)	かいよう病 アブラムシ類	I Cボルドー66D モスピラン顆粒水溶剤	50倍 4000倍	葉芽発芽前/ー 前日/3回	
3月下旬 (発芽期)	黒星病・すす斑病 かいよう病 ハナムシ・アブラムシ類	ベルコート水 マイコシールド ロディー水和剤	2000倍 1500倍 4000倍	30日前/3回 21日前/4回 7日前/3回	○かいよう病にはアグレプト水和剤1000倍（90日前/2回）も可 ただし、使用前日数と回数に注意!! ○ロディー水の散布は養蜂巣箱撤去後に
4月上旬 (幼果期)	黒星病・すす斑病 かいよう病	ナティーボフロアブル スターナ水和剤	2000倍 1000倍	前日/2回 7日前/3回	○ウメシロカイガラムシ・アブラムシ・ハダニ類には モベントフロアブル2000倍（7日/3回）4月下旬に散布
4月中旬 (果実肥大期)	黒星病・すす斑病 かいよう病 ケムシ類・コスカシバ	デランフロアブル マイコシールド フェニックス F	1500倍 1500倍 4000倍	14日前/2回 21日前/4回 前日/2回	※混用順 モベント F → アグレプト水 または マイコシールド ○すす斑症にはオーソサイド水和剤800倍（21日前/3回）も可
4月下旬 (果実肥大期)	黒星病・すす斑病 かいよう病	オーソサイド水和剤 マイコシールド	800倍 1500倍	21日前/3回 21日前/4回	ただし、高温（25℃以上）や多湿時の薬害に注意 ○黒点症・油揚げ症対策および降雨が多いと予測される場合は グッドパートナー25の加用が良い
5月上旬 (果実肥大期)	黒星病・すす斑病 カイガラムシ類	デランフロアブル アプロード F	1500倍 1000倍	14日前/2回 7日前/2回	
5月中下旬 (青梅収穫直前)	黒星病・すす斑病 カメムシ類・ケシスイ	スコア顆粒水和剤 ダントツ水溶剤	2000~3000倍 2000倍	前日/3回 前日/3回	
6月上旬 (漬け梅収穫直前)	黒星病・すす斑病	スコア顆粒水和剤	2000~3000倍	前日/3回	○ケシスイ、クビアカツヤカミキリ対策として モスピラン顆粒水溶剤 2000倍 前日/3回
7~8月（収穫後）	ケムシ類	ロディー水和剤	2000倍	7日前/3回	○多発園のみ
9月上中旬 (収穫後)	ウメシロカイガラムシ	アプロード水和剤	1000倍	収穫後落葉前/2回	○多発園のみ ○コスカシバ、キクイムシ（休眠期）には ガットキラー乳剤100倍 落葉に注意

●クビアカツヤカミキリ幼虫対策としてフラス（木くず、虫ふん）の発生が確認されたら樹幹・樹枝の食入孔へのロビンフッド（前日/5回）を噴射しながら注入する。

※太文字および下線部分が昨年の防除暦からの変更点になります。