

2025年度かき（平核無）防除暦

(株) 山東農園 [フリーダイヤル] 0120-09-9393 [FAX] 073-478-2655

防除時期	対象病害虫	防除薬剤	倍数	収穫前日数/使用回数	備考
12月～3月	各種病害虫	粗皮削り及び落葉処理			○落葉病防止には落葉処理が重要。
3月下旬 (発芽前)	カイガラムシ類	アプロード水和剤 アビオンE	1000倍 1500倍	45日前/2回	
4月下旬 (新梢伸長期)	うどんこ病 アザミウマ・イラガ・カイガラムシ	イオウフロアブル トクチオン水和剤	500倍 800倍	-/- 75日前/2回	○イラガ類、多発園ではコスカシバも含めて フェニックスF 4000倍 を加用する。
5月中下旬 (開花期)	落葉病・炭そ病 チャノキイロアザミウマ ハダニ類	ジマンダイセン水和剤 オルトラン水和剤 ダニコングフロアブル	400倍 1500倍 4000倍	45日前/2回 45日前/2回 前日/1回	○灰色かび病多発園は、ジマンダイセン水にかえて フルーツセイバー 1500倍が良い。
5月下旬～6月上旬 (幼果期)	落葉病・炭そ病・うどんこ病 アザミウマ類・ヘタムシガ	ミギワ20フロアブル ディアナWDG アビオンE	4000倍 10000倍 1000倍	前日/3回 前日/2回	○フジコナカイガラムシ多発園では、 トクチオン水 800倍（収穫前75日/2回） ただし、収穫前日数厳守・ドリフト注意！
6月中下旬 (生理落果期)	落葉病・炭そ病 チャノキイロアザミウマ フジコナカイガラムシ	ジマンダイセン水和剤 コルト顆粒水和剤 アビオンE	400倍 2000倍 1000倍	45日前/2回 前日/3回	○ヘタムシ第1世代の防除適期は富有柿の開花10日後。 ○黒変果の軽減にストピット II 500倍を2～3回散布。
7月上中旬 (生理落果期)	落葉病・炭そ病・うどんこ病 カイガラムシ類 アザミウマ類	ナティーボフロアブル モスピラン顆粒水溶剤	2000倍 2000倍	前日/3回 前日/3回	
7月下旬～8月上旬 (果実肥大期)	落葉病・炭そ病・すす点病 うどんこ病 アザミウマ類 カメムシ類・ヘタムシガ	ベルコート水和剤 ダントツ水溶剤	1500倍 3000倍	14日前/3回 7日前/3回	○ヘタムシ多発園では、サムコル10F5000倍（収穫前日/3回） ○カメムシ発生園では、ダントツ水4000倍、キラップF2000倍 アルバリン顆粒水2000倍、テルスターF5000倍
8月下旬～9月上中旬	落葉病・炭そ病・うどんこ病 カメムシ類・ヘタムシガ	ベンレート水和剤 アグロスリン水和剤	2000倍 1500倍	前日/6回 前日/3回	○降雨が続いたり炭そ病が心配な園では、9月中旬以降。 スコア顆粒水3000倍の追加防除が良い。